




terraorga
TARIM

www.terraorga.com





TerraOrga, Bereketli Ola!

İÇİNDEKİLER

- 06 HAKKIMIZDA
- 08 ORGANOMAX
- 10 TERRA AMİNO
- 12 TERRA STRONG
- 14 FLOWER REPLICA
- 16 CALTEX
- 18 TERRA GROWTH
- 20 FRUIT INFLATOR
- 22 TERRA ZNX
- 24 FRUIT FILLER
- 26 TERRA NITROGENA
- 28 TERRA CAL
- 30 TERRA WET
- 32 TERRA COMBİ
- 34 TERRA BALANCER
- 36 TERRA BALANCE
- 38 TERRA İRVA
- 40 TERRA



terra
TERRA
TERRA





TennaOnga, Beneketli Ola!



TerraOrga Tarım Limited Şirketi 2019 yılında , tarımın kalbi olan Antalya'da kuruldu. Üretmekte olduğu organik, organomineral ve kimyasal gübreler ile sürdürülebilir tarımın sonraki nesillere aktarılabilmesini amaçlar.





AR- GE alıřmaları ve Deęerli Ziraat Mühendisleriyle **“SAęLIKLI NESİLLER YETİřTİRMEK”**, evrensel bir deęer olan topraęın korunması, kalitesinin artırılıp ok daha verimli hale gelmesi iin; **İNSAN-HAYVAN-DOęA DOSTU** gbreler reterek, hem iftimizin yzn gldrmek hem de insanlıęa hizmet iin kuruldu TerraOrga.

Daha mutlu , daha saęlıklı bir gelecek iin, **“ TERRAORGA , BEREKETLİ OLA ”**



ORGANOMAX

Bitkisel Menşeli
Sıvı Organik
Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Organomax, zengin organik içeriđi sayesinde toprađı mikro organizma faaliyetleri ađısından zenginleřtirir.
- Mevsimsel kořullardan kaynaklanan stresin engellenmesine yardımcı olur.
- Bitkide sađlıklı ve güçlü kök gelişiminin gerçekleřmesini sađlar. Saçak oluşumunu teşvik eder.
- Bitki besin elementlerinin alımını kolaylařtırır ve gübrelerden elde edilecek faydayı artırır.
- Bitkinin KÖK Hastalıklarına karřı direncini artırır.
- Güçlü kök oluşumunu sađladığı için, bitkide hızlı bir gelişim sađlanır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

:W/W

Organik Madde	%40
Organik Karbon (C)	%18
Toplam Azot (N)	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%2

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN (da)
Sera Yetiřtiriciliđi (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.)	Düzenli tüm vejetasyon süresince	200-300 cc/100 lt su	3-4 lt/da
Açık Tarla Yetiřtiriciliđi (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.)	3-4 uygulama yetiřme süresince	300-400 cc/da	2-3 lt/da
Meyve Yetiřtiriciliđi (Narenciye, Ceviz, Fındık, Elma, Zeytin, Armut, Kiraz, Kayısı, řeftali, Erik vb.)	3-4 uygulama yıl boyunca	200-300 cc/100 lt su	2-3 lt/da
Muz	3-4 uygulama yıl boyunca	—	2-3 lt/da
Bađ	2-3 uygulama yıl boyunca	200-300 cc/100 lt su	2-3 lt/da
Yer Fıstığı	2-3 uygulama yetiřme süresince	300-500 cc/da	2 lt/da
Patates	2-3 uygulama yetiřme süresince	300-500 cc/da	2 lt/da
Çeltik	2-3 uygulama yetiřme süresince	300-500 cc/da	2 lt/da
Tarla Bitkileri (Buđday, Arpa, Nohut vb.)	2-3 uygulama yetiřme süresince	300-500 cc/da	2 lt/da
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Ayçiçeđi, Soya, Tütün vb.)	2-3 uygulama yetiřme süresince	300-500 cc/da	2 lt/da
Kesme Çiçekçilik	4-5 uygulama yıl boyunca	200-300 cc/100 lt su	2-3 lt/da

**ORGANO-
MAX**



TERRA AMiNO

Organik Ürünler

Bitkisel Menşeli Amino
Asit İçeren Sıvı Organik
Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Terra Amino, bitkilerin sağlıklı ve dirençli bir biçimde gelişmesini sağlar.
- Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder.
- Olumsuz iklim ve toprak koşullarının sebep olduğu stres faktörlerine karşı dayanıklılığı artırır.
- İçinde bulunan amino asit ve organik karbon sayesinde makro ve mikro besinlerin, bitkiler tarafından kolay alınmasını sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%40
Organik Karbon (C)	%17
Toplam Azot (N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%0,5
Serbest Amino Asit	%8

:W/W

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN
Narenciye, Zeytin	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	150-200 cc/100 lt	250-500 cc/da
Taş Çekirdekli Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne vb.)	Fare kulağı dönemi ve çağla döneminde uygulanır.	150-200 cc/100 lt	250-500 cc/da
Elma, Armut, Ayva, Nar vb.	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	150-200 cc/100 lt	250-500 cc/da
Bağ	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	150-200 cc/100 lt	250-500 cc/da
Sebzeler (Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Yeşillikler vb.)	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	100-150 cc/100 lt	500 cc-1 lt/da
Mısır	15-20 cm boya ulaştığında ve 40-50 cm boya ulaştığında uygulanır.	150-200 cc/100 lt	-
Pamuk	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	100-150 cc/100 lt	-
Karpuz, Kavun vb.	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	150-200 cc/100 lt	500 cc-1 lt/da
Çilek, Muz	Çiçeklenme öncesi meyve tutumundan itibaren, meyve büyütme döneminde uygulanır.	150-200 cc/100 lt	1 lt/da
Şeker Pancarı, Patates, Tütün	3-4 yapraklı dönem ve meyve bağlama döneminde uygulanır.	100-200 cc/100 lt	500 cc-1 lt/da
Buğdaygiller	Kardeşlenme dönemi ve sapa kalkma döneminde uygulanır.	50-100 cc/da	-

**TERRA
AMiNO**



TERRA STRONG

Organik Kaynaklı
Ürünler

Sıvı Deniz Yosunu

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Terra Strong, toprak yapısını iyileştirir ve kök gelişimini destekler.
- Bitkileri stres faktörlerinden korur, sağlıklı ve genç kalmalarını sağlar.
- Topraktaki besin maddelerinin bitki tarafından alınımı kolaylaştırır.
- Klorofil seviyesini artırarak bitkilerin daha fazla fotosentez yapmasını teşvik eder.
- Klorofil miktarının artması bitkinin yeşil aksamalarının daha sağlıklı ve gösterişli olmasını sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit (C₆H₈O₆)n

:W/W

%10

%3

%1

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (da/100 lt su)	DAMLAMADAN DEKARA
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Patates, Soğan, Sarımsak, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak vb.) (Her türlü açık ve kapalı olan sebze yetiştiriciliğinde)	-Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) -2. çiçekten hasada kadar (2-3 uygulama)	100-150 cc 100-150 cc	400-500 cc 400-500 cc
Meyve Ağaçları (Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyvelerde, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Erik, Vişne, Elma, Armut, Badem, Fındık, Nar vb.)	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişimi ve renklenme döneminde birer uygulama	100-150 cc	400-500 cc
Bağcılık (Sofralık ve kuru üzümde çekirdekli ve sultaniye her çeşit için)	Sürgünler 3-5 cm iken, salkım uzama dönemi, çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde	100-150 cc	400-500 cc
Çilek	Sezon boyunca	100-150 cc	400-500 cc
Pamuk	6-8 yapraklı dönemden hasata kadar	100-150 cc	400-500 cc
Fıdancılık ve Kesme Çiçekçilik	Gelişim dönemi boyunca	100-150 cc	400-500 cc
Yeşil Tüketim Bitkileri (Marul, Maydanoz, Tere, Roka vb.)	Gelişim dönemi boyunca	100-150 cc	400-500 cc
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.)	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	100-150 cc	400-500 cc
Zeytin	Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadarki yaz dönemi boyunca	100-150 cc	400-500 cc
Narenciye	Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar	100-150 cc	400-500 cc
Tütün	Fidelik döneminde, dikimden kırım dönemine kadar 3 uygulama	100-150 cc	400-500 cc
Sanayi Bitkileri (Şeker Pancarı, Anason, Ayçiçeği, Mısır vb.)	Erken gelişme döneminde minimum 2 uygulama	100-150 cc	400-500 cc
Nohut	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	100-150 cc	400-500 cc

**TERRA
STRONG**



FLOWER REPLICA

Organomineral Ürünler

NP'li Sıvı
Organomineral
Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Flower Replica, içeriğindeki serbest amino asitler sayesinde NP'nin hem kökten hem de yapraktan alımını kolaylaştırır.
- Çiçeklenme ve döllenmeyi teşvik eder.
- Bitkileri gece-gündüz ve iklim farkından oluşan ısı değişikliğinden kaynaklanan stresten korumaya yardımcı olur.
- Hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

:W/W

Organik Madde	%12
Toplam Azot (N)	%5
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%2,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%2,5
Toplam P ₂ O ₅	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%3
Serbest Amino Asit	%2

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN (da)
Sera Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Açık Tarla Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	-
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Elma, Armut, Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	-
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik, Tütün	Yumur oluşumundan itibaren hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	-
Kesme Çiçekçilik vb.	Gelişme döneminden 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Buğdaygiller (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)	Kardeşlenme döneminde 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	-
Yeşil Alanlar	Faal dönemde 15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	-

**FLOWER
REPLICA**



CALTEX

Organomineral Ürünler

İkincil ve İz Element
Katkılı Sıvı Organomineral
Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Caltex, çiçek dökülmesini engeller ve meyve döneminde sap kalınlığını artırır.
- Meyvelerde şekil bozuklukları, acı benek ve uç kuruması gibi olumsuzlukları engellemeye yardımcı olur ve kaliteyi artırır.
- İçeriğindeki serbest amino asitler sayesinde bitkiler tarafından kolay alınır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%20
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%2
Suda Çözünür Bor (B)	%1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%1
Serbest Amino Asit	%4

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Antep Fıstığı, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Zeytin	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Çeltik	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Çay	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²

CALTEX



TERRA GROWTH

Organomineral Ürünler

Azotlu Sıvı
Organomineral
Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Terra Growth, meyve döneminde bitkinin ihtiyacı olan beslemeyi sağlar.
- Meyve gelişimini destekler. Mısır, arpa ve buğdayda tane büyüklüğünü artırır ve kardeşlenmeyi teşvik eder.
- İçeriğindeki serbest amino asitler sayesinde bitkiler tarafından kolay alınır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%20
Toplam Azot (N)	%16
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%4
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%8
Suda Çözünür Demir (Fe)	%1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%3
Serbest Amino Asit	%4

:W/W

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN (da)
Sera Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Açık Tarla Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Elma, Armut, Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik, Tütün	Yumur oluşumundan itibaren hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Kesme Çiçekçilik vb.	Gelişme döneminden 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Buğdaygiller (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)	Kardeşlenme döneminde 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Yeşil Alanlar	Faal dönemde 15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt

**TERRA
GROWTH**



FRUIT INFLATOR

Organomineral Ürünler

NK'lı Sıvı
Organomineral
Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Fruit Inflator, kaliteli ve yüksek oranlı potasyum içeriği sayesinde meyve döneminde bitkileri- nizin ihtiyaç duyduğu beslemeyi sağlar.
- Meyve veriminde, aromasında, lezzetinde ve kalitesinde artış sağlar.
- Özel içeriği sayesinde meyvelerde meydana gelen çatlamaları engeller. Sağlıklı ve uzun raf ömürlü meyve verimi sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%20
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%33
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%3

:W/W

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN (da)
Sera Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Açık Tarla Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Elma, Armut, Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik, Tütün	Yumru oluşumundan itibaren hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Kesme Çiçekçilik vb.	Gelişme döneminden 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Buğdaygiller (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)	Kardeşlenme döneminde 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Yeşil Alanlar	Faal dönemde 15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt

FRUIT INFLATOR



TERRA ZNX

Organomineral Ürünler
İz Element Katkılı Sıvı
Organomineral Gübre

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Terra Znx, bitki boyu ve dal gelişimini sağlar.
- Tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkma faaliyetlerini destekler.
- Genç sürgünlerde görülen uç kurumasının önüne geçer.
- Yaprak ve meyve dökülmesini engeller.
- İçeriğindeki serbest amino asitler sayesinde bitkiler tarafından alımı kolaydır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	%20
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%10
Serbest Amino Asit	%4

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Antep Fıstığı, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Zeytin	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Çeltik	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Çay	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc/100 lt su	0.5-1 lt/1000m ²

**TERRA
ZNX**



FRUIT FILLER

Organomineral Ürünler

NK'lı Sıvı
Organomineral
Gübre

Ambalaj	Koli
7 Kg	3
21,3 Kg	1



- Fruit Filler, meyve döneminde bitkinin ihtiyaç duyduğu potasyum ihtiyacını karşılar.
- İçeriğindeki mikro elementler sayesinde bitki besin noksanlıklarını giderir.
- Meyve veriminde, aromasında, lezzetinde, renginde ve kalitesinde artış sağlar.
- Kolay eriyen jel formundadır. Yüksek konsantrasyonlu olmasına rağmen akıcıdır ve sulama sistemlerine herhangi bir zarar vermez.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Organik Madde	%12
Toplam Azot (N)	%6
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%4
Suda Çözünür Bor (B)	%0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,2

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN (da)
Sera Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Açık Tarla Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	-
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Elma, Armut, Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	-
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	2-5 lt
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik, Tütün	Yumur oluşturmundan itibaren hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	-
Kesme Çiçekçilik vb.	Gelişme döneminden 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	2-5 lt
Buğdaygiller (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)	Kardeşlenme döneminde 1-2 kez uygulanır.	300-400 cc	-
Yeşil Alanlar	Faal dönemde 15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 cc	-

FRUIT
FILLER



TERRA NITROGENA

Ec Fertilizer

Azotlu Gübre
Çözeltisi

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Terra Nitrogena, vejetatif gelişim için büyük önem arz eden Azot'un sıvı formudur.
- Bitkilerde fotosentez etkinliğini ve kuru madde birikimini artırarak boyun uzamasını sağlar. Bodur gelişimi önler.
- Dal, yaprak ve sürgün gelişimini hızlandırır.
- Yaprak ve meyve dökülmelerini engeller.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%16
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%8
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%8

:W/W

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt su)	TOPRAKTAN
Narenciye	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	100-150 cc	3-4 lt/da
Meyve Ağaçları	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	100-150 cc	2-4 lt/da
Bağ	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	100-150 cc	2-4 lt/da
Tahıllar, Şeker Pancarı, Arpa, Patates, Tütün, Buğday	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	50-100 cc	1-2 lt/da
Bahçe Bitkileri	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	100-150 cc	1-2 lt/da
Mısır	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	100-150 cc	1-2 lt/da
Kesme Çiçekçilik	Çiçeklenme öncesi, ihtiyaç duyulan her dönem	100-150 cc	1-2 lt/da

**TERRA
NITROGENA**



TERRA CAL

Ec Fertilizer

Kalsiyum Nitrat Çözeltisi
(Yaprak ve Damlama
Uygulaması İçin)

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Terra Cal, verim ve kaliteyi artırır.
- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık sağlar.
- Meyvelerin depolama ömrünü uzatır ve nakliyede dayanıklılık sağlar.
- İçerisinde Kalsiyum ve Nitrat olduğu için bitkiler tarafından kolay alınır.
- Kalsiyum klorür kullanılmadığı için tuzluluk yapmaz.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%8
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%7,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%0,5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%15
Suda Çözünür Bor (B)	%0,2

:W/W

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sera Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
Açık Tarla Sebzeleri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 4-5 kez uygulanır.	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
Elma, Armut, Ayva	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tütün	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak	Yumur oluşumundan itibaren hasata kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da
Kesme Çiçekçilik, Çim Alanları, Çeltik	Gelişme döneminden 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	2-3 kg/da

**TERRA
CAL**



TERRA WET

Ph Düşürücü
Yayıcı - Yapıştırıcı

Ambalaj	Koli
1 lt	20
5 lt	4
20 lt	1



- Bitki koruma ilaçlarının ve yaprak gübrelereinin, bitkinin yapraklarına ve dallarına ince bir film tabakası halinde homojen olarak yayılmasını ve yapışmasını sağlar. Böylece, verilen ilaç ve gübrenin rüzgar veya yağmurla kaybını önleyerek bitkinin bundan istifade etme süresini uzatır, uygulama başarısı artar.
- Zirai mücadele ilaçları ve yaprak gübrelereinin iri damlacıklar halinde toplanmasının önüne geçerek, meyveler üzerinde arzu edilmeyen lekelerin oluşmasını ve yaprakların yanmasını engeller.
- Ayrıca, ilaçlama aletinin uygulama sonrası temizliğinde de kullanılır.

Maksimum sonuç için ideal pH 4,5-5,5 aralığında olmalıdır.

Kullanımı: 100 litre suya 75/100 cc

FAYDALARI

İlaçların ve yaprak gübrelereinin, sürgün meyve dallara ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar.

-İlaçların bitkiye uygulandıktan sonra bitki yüzeyinden akmasını ve ilaç kaybını önler.

-Yaprak yüzeyine uygulanan ilaçlı su damlacıklarının yayılmasını sağlayarak, damlamaların damlacıklarının yayılmasını sağlayarak, damlamaların mercək etkisi yaparak yaprakların ve sürgünlerin yakmasını önler.

-Alkali nitelikli sularda yapılan ilaçlamalarda, ilaçlı suyun ilacın pH'ını düşürür ve tamponlar.

-İlaçların ve yaprak gübrelereinin %100 bitkinin emrine girmesini sağlar.

-Suyun kirecini parçalayarak alınabilir kalsiyumu çevirir.

**TERRA
WET**



TERRA COMBİ

EC FERTİLİZER

Ambalaj	Koli
1 kg	20
5 kg	4
25 kg	1



- Terra Combi, bitkilerin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu mikro elementleri ihtiva eder.

- Doku gelişiminin ve bütün hayatı fonksiyonların sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlar.

- Özel olarak formüle edilmiş içeriği ve şelatlama teknolojisi sayesinde hem yapraktan, hem de topraktan uygulanabilmekte ve bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilmektedir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)	%1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%1
Suda Çözünür Demir (Fe)	%6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%10

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Antep Fıstığı, Fındık	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Zeytin	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Çeltik	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Çay	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²

**TERRA
COMBI**

- Terra Balancer azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra bitki gelişimi açısından çok büyük önem arz eden mikro elementleri de içeren besin maddeleri karışımıdır.
- Kök sistemini geliştirir.
- Dal, yaprak ve sürgün gelişimini artırır, bodur gelişmeyi önler.
- Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar.
- Tomurcuk ve çiçek oluşumunu, meyve bağlama ve meyve kalitesini artırır.
- Özel olarak formüle edilmiş içeriği sayesinde kolay çözünür ve sulama sistemlerine zarar vermez.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	:W/W
Toplam Azot (N)	%20
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%5,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%10,5
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bor (B)	%0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,02

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	-
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	-
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	-


**TERRA
BALANCER**



TERRA BALANCE

18-18-18+TE
NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ
EC FERTİLİZER

Ambalaj	Koli
1 kg	20
5 kg	4
25 kg	1



- Terra Balance azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra bitki gelişimi açısından çok büyük önem arz eden mikro elementleri de içeren besin maddeleri karışımıdır.
- Kök sistemini geliştirir.
- Dal, yaprak ve sürgün gelişimini artırır, bodur gelişmeyi önler.
- Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar.
- Tomurcuk ve çiçek oluşumunu, meyve bağlama ve meyve kalitesini artırır.
- Özel olarak formüle edilmiş içeriği sayesinde kolay çözünür ve sulama sistemlerine zarar vermez.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

:W/W

Toplam Azot (N)	%18
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%9,7
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%8,3
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%18
Suda Çözünür Bor (B)	%0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,02

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	-
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	-
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	-

**TERRA
BALANCE**



TERRA İRVA

15-30-15+TE
NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ
EC FERTİLİZER

Ambalaj	Koli
1 kg	20
5 kg	4
25 kg	1



- Terra İrva, fosfor ağırlıklı bu formülasyon bitkilerin genç dönemlerinde fosforun depolanması, çiçeklenme döneminde ise sağlıklı çiçek oluşumu için kullanılır.
- Meristem dokunun gelişimine yardımcı olur.
- İçeriğindeki mikro elementler sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu sağlıklı beslemeyi sağlar.
- Özel olarak formüle edilmiş içeriği sayesinde kolay çözünür ve sulama sistemlerine zarar vermez.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	%15
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%6,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%8,5
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%15
Suda Çözünür Bor (B)	%0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,02

:W/W

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	-
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	-
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	-

TERRA
İRVA



TERRA

16-8-24+TE
NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ
EC FERTİLİZER

Ambalaj	Koli
1 kg	20
5 kg	4
25 kg	1



- Terra, yüksek oranda potasyumun yanında azot ve fosfor içermekte ayrıca bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin elementlerini ihtiva eder.
- Özellikle çiçeklenme sonrasındaki gelişim döneminde ve hasat boyunca kullanılması tavsiye edilir.
- İçeriğindeki potasyum meyve gelişiminin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini, hastalık ve zararlılara karşı ürünlerinizin dirençli olmasını sağlar.
- Ayrıca içeriğindeki azot ve fosfor çiçeklenme ve kök gelişiminin devamlılığına destek verir.
- Özel olarak formüle edilmiş içeriği sayesinde kolay çözünür ve sulama sistemlerine zarar vermez.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Toplam Azot (N)	%16
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%9,5
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%6,5
Nötral Amonyum Sitrat Ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Bor (B)	%0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,02

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Narenciye	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Elma, Armut vb.	Çiçeklenme sonrasından itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Nar	Çiçeklenme sonrasından itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Bağ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kivi, İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Domates, Biber	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hıyar, Patlıcan	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kavun, Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Mercimek	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	-
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Şeker Pancarı, Tütün	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	-
Meyve Fidanları	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000m ²
Hububat	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/100 lt su	-
Yeşil Alan Bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr/100 lt su	-

TERRA

TERRAORGA TARIM LTD. ŐTİ.

Aőaęıroba Mah. Toptancılar Birlięi Sok. No:102 İ Kapı No:28
DÖŐEMEALTI/ANTALYA

Tel: 0242 257 04 04

www.terraorga.com